

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki	Hastalık adı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
BAĞ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	175 g/100 l su	14
ZEYTİN	Halkalı leke hastalığı (<i>Spiloseae oleagina</i>)	175 g/100 l su	14
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 g/100 l su	14
KAYISI	Yaprakdelen (Çil) (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	1.ilaçlama: 400 g/100 l su 2.ilaçlama: 200 g/100 l su 3.ilaçlama: 200 g/100 l su	14
PATATES	Patates mildiyüsü (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/dekar	14
ŞEFTALİ	Şeftali yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	300 g/100 l su	-



KOCİDE® 2000

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

SUDA DAĞILABİLEN KURU AKIŞKAN GRANÜL (DF)

Bakır Hidroksit % 53.8

(% 35 metalik bakıra eşdeğerdir.)
Sıçanlarda akut oral LD₅₀: 489 mg/kg

ZEHİRLİ

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kaptan bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Daha sonra yarıya kadar su ile doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilir. Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalıdır. Sonra geri kalan kısım su ile tamamlanır. Yayıcı, yapıştırıcı ve bitki besin maddeleri aletin deposuna en son ilave edilmelidir. KOCİDE 2000 ilacın ortamın pH'ı 6,5'ten daha düşük olan eriyiğe karıştırılmamalıdır. Aksi halde birlikte yakma yapılabilir.

İLACIN KULLANMA ZAMANI:

BAĞ

İlaçlamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalı, hava şartlarına ve hastalığın gelişme durumuna göre 7-10 gün aralar ile devam edilmelidir. Hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığına ilaçlamalara son verilmelidir. İlaçlamalarda asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır. İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde yapılmalıdır.

ZEYTİN

Marmara Bölgesinde birinci ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, ikinci ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında yapılmalıdır. Ege Bölgesinde ilk ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, ikinci ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılır.

DOMATES

İlaçlamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve ilaçlama hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.

KAYISI

Kayısıda aşağıda belirtilen dönemlerde üç kez ilaçlama yapılmalıdır.

- 1.ilaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
- 2.ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
- 3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

PATATES

Patates mildiyösünün her yıl görüldüğü yerlerde hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya başlanacak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenir. Hastalığın sıcak ve kuru geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile, serin ve yağışlı bölgelerde ise 7 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

ŞEFTALİ

İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA SİĞARA İÇMEYİNİZ.

İLACIN DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMADAN SONRA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Zehirlenme Belirtileri:

Hızlı soluma, sinirlilik, kanlı ishal, heyecan, bulanık görme, baş dönmesi, baş ağrısı, yeşil-mavi renkli kusma, burun akıntısı, ağızda metalik tat, su ve elektrolit kaybı, halsizlik.

İlk Yardım Tedbirleri:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Göze bulaşmışsa göz kapaklarını açık tutunuz ve onbeş dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Hastayı ilacli yerden uzaklaştırınız ve suni tennefüs yaptırınız. Ağız yolu ile yutulmuşsa bol süt, yumurta akı ve jelatin solüsyonu içiriniz. Eğer bunlar yoksa, bol su içiriniz ve hastayı kusturunuz.

ANTİDÖTÜ ve Tedavisi için Gerekli Bilgiler:

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım amacı ile Plazma ve Novadrol verilir.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Merkezi(UZEM)** telefon numarasını arayarak ilacli ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) : 114



© DuPont'un tescilli markasıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

KOCİDE 2000 ilacı Fosetyl-AI etkili maddeli fungusit ile ortamın pH'ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksite meydana gelebilir. İlaçların karışılabilirlik durumları bilinmiyorsa, ilaç aletin deposuna ilave edilmeden önce "kavanoz testi" uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce ilaçların etiketlerindeki karışılabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır. Daha fazla bilgi için ilacın ruhsat sahibine veya satıcı firmaya başvurunuz.

DAYANIKLILIK:

Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip fungusitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı hastalık türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu hastalıklara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip fungusitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması hastalık etmenlerinin dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirli değildir.

Balıkla ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

İlacli orjinal ambalajında ağız kapalı olarak serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden ve yemlerden ayrı olarak muhafaza ediniz. Boş ambalajları, atık suyu ve kullanılmayan ilacı akarsu, göl, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerine bulaştırmayın, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI :

DuPont bu ilacın etiketteki kimyevi maddede uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararları, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki, bunlar DuPont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlılardan DuPont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DUPONT, BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELERİN DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN, NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VERMEZ.

Ruhsat Sahibi:

DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Tavşancılı Beldesi, Eynarca Mevkii
Dilovası, 41455
Gebze / Kocaeli
Tel: 0262-754 56 60
Faks: 0262-754 98 54

İmalatçı Firma:

Du Pont de Nemours and Co. (Inc)
Wilmington DE 19898 ABD

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



DuPont Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13 Subat 2008