

İmal Tarihi :
Son Kalibrasyon Tarihi :
Seri No :
Fiyat teklifi tarih ve no :

GENEL BİLGİLER: KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

BİTKİ	Hastalık	Doz	Son ilaçlama ile Hastalık Aşamadaki Süre (gün)
Hayar	Yalançı Miladyo (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	40 gr/100 lt.su	3
Domates	Miladyo (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 gr/100 lt.su (sezon)	3
	Etkin Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	40 gr/da (tarla)	
Patates	Miladyo (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 gr/100 lt.su	28
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	40 gr/da	
Karpuz		40 gr/da (tarla)	3

İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

İlaci hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaqlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurular, Equaton® Pro sırt bir karpuz bir miktar su ile emilerek depoya konular. Mekanik yada hidrolik karıştırma ile yavaş karıştırılır ve partı kasan su miktarı depoya ilave edilir. Karıştırılmaya başlanırsa boyuncuza devam edilmelidir. İlaqlama sırasinda bklöl bir şekilde ilaqlanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaqlama havanın serin ve salgın zamanlarında yapılmalıdır. İlaqlama etnasında ilac zemindeki ve buharından korununuz.

İLACIN UYGULANMASI:

Hayarda Yaşanıcı miladyo hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaqlanmaya başlanılır ve hastalık için etkenli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaqlanmaya devam edilir.

Domateste Miladyo ve Erken yaprak yanıklığı hastalıklarına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaqlanmaya başlanılır ve hastalık için etkenli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaqlanmaya devam edilir.

Başğda Miladyo hastalığına karşı sığır otları 25-30 cm'ye ulaştığında ilaqlanmaya başlanılır ve hastalık için etkenli hava şartları devam ettiği sürece 10-12 gün aralarla ilaqlanmaya devam edilir.

Patateste Miladyo hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaqlanmaya başlanılır ve hastalık için etkenli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaqlanmaya devam edilir.

Karpuzda Erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaqlanmaya başlanılır ve hastalık için etkenli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaqlanmaya devam edilir.

Equaton® Pro ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık emeninin bitkilere ilk gişiriden sonra başğarda 2-3 gün domates, hayar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaqlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

Equaton® Pro farklı ekti mekanizmaları olan Fomoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisitir.



Equation® Pro

Fungisit (Manber ilacı)

Suda Dağılılabilir Granül (WG)

%22,5 Fomoxadone + %30 Cymoxanil

Fomoxadone: 5-metkyl-5-(4-piperonyloxyphenyl)-3-(phenylamino)-2,4-oxazolinedione

Cymoxanil: 2-cyano-N-(4-bromophenyl)-2-methylpiperidineacetamide

Akut ağızdan LD 50 (siçan): 1196 mg/kg.

DİKKAT

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EYDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- İLAÇ BUKARINI VE ZERRELERİNİ TEMİZLİKSİZ ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, SİĞARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- İLAÇLAMA SAHAĞA BİR GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAŞIYIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ANTİDÖTÜ VE İLK YARDIMI:

Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ulusal Zehir Merkezi ÜZEM: 114

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gastrointestinal rahatsızlık, yanma, diyaire, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

İLK YARDIMI TEDBİRLERİ:

Yutulması halinde: 1-2 bardak su için ve hastayı tıbbi yardım olmadan kusturmayın. Bilinçli yerinde olmayan kişiyi sırtına eğilmeden birşey vermeyin. Hermen doktor çağırın.

Soluması halinde: Hastayı temiz ve iyi havalandırılmış bir yere götürün, eşer nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Ciddi zehirlenme durumunda hermen doktor çağırın.

Gözle temas halinde: 15 dakika streyle gözü ve göz kapagını suyla yıkayın. Gözde tahış devam ediyorsa doktor çağırın.

Deri ile teması durumunda: Bol su ve sabunla yıkayın.



FAHRETTİN KÖYLÜLERİ BAKANLIĞI
KURUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

® Dupont'un basıllı markasıdır.

Net Ağırlığı :
Etek Ağırlığı :
Azamî Perakende Satış Fiyatı:
Rulosa Tarihi : 24.03.2000
Rulosa No : 3739

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Normal (serin ve kuru) şartlarda ofinal ambalajında depolanıldığında 2 yıl süre ile taacin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde boğğdu (tozların sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Equaton® Pro ofinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yerlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.

ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ:
Boğ ilaç ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız. Boğ ambalajları ya da ilacın fazlasını su kaynaklarından uzak bir yerde toprağına gömünüz ya da usulüne göre imha ediniz.

Balıklar zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI :

Dupont bu ilacın etiketeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanıma gartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etkide yerleşmiş kullanıma geyesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek (tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, leşirizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya azu edilmeyen ilaqlamalardan meydana gelebilir ki bunlar Dupont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaqa tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaqlama koşulları dışında şartlarda yapılan ilaqlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Dupont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DUPONT BU İLACIN YIKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DİŞİNDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMİZ.

Ruhsat Sahibi:

Dupont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1.Kısmi Tuna Caddesi No:1

Dilovası/Kocaeli

Tel: 0262-754 56 60


Faks: 0262-754 98 54

Üretici:

Dupont de Nemours (France) SA

137 rue de l'Université

Cedex 07 FFRANSA



DUPONT Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Equation® Pro ilaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmurattan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlama gereği yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip fungisitler üst Bste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı hastalık türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede halden hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu hastalıklara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip fungisitlerin değişimi olarak kullanılması veya bu tür ilaçlara tank karışımı yapılması hastalıklamın dayanıklılık kazanmasını geçiktirir veya engeller.

FITOTOKSİTE:

Equation® Pro tavsiyeler göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARŞISABİRLİK:

Equation® Pro bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Alkali özallikte ilaçlarla karıştırmayınız. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karşısabirliğin önceden küçük çapta denemesi tavsiye edilir.



DUPONT Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Equation® Pro

Fungisit (Nemat İlacı)
Suda Dağılımlı Granül (WG)

%22,5 Farnoxadone + %30 Cymoxanil
Farnoxadone: 5-metil-5-(4-phenoxiphenyl)-3-(phenylamino)-2,4-oxazolindionna
Cymoxanil: 2-(3-ano-N-(6-etylamino)carboxyl)-2-(metiloxymetil)asetatında

28 Temmuz 2009

