

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri No :
Fiyat tasdik tarihi ve no :



Net Ağırlığı :
Brüt Ağırlığı :
Azamî Penkende Satış Fiyatı:
Ruhşat Tarihi : 09.01.1988
Ruhşat No. : 2098

GENEL BİLGİLER:

PUNCH® 40 EC Steril İnhibitör grubuna ait geniş etkili alani bir fungisittir. PUNCH® 40 EC sistemliktir. Koruyucu ve tedavi edici özellikleri vardır. Elma kara lekeli üzerindeki tedavi edici etkilik, enfeksiyonlardan itibaren 4 gün içinde yapılan tabahatların, bithassa hastalık basısının çok fazla olduğu dönemlerde koruyucu olarak 14 gün aşırıyın aralıklarla yapıldığında alınır. PUNCH® 40 EC hızı bir seferde bitki yapış aşaması tarafından bölünmeye alınır ve aşağıdan yukarıya doğru (Acropetal) hareket eder. Tabahattan 4 saat veya daha sonra yapılan yağmur (Acropetal) hareketi eder. Tabahattan 4 saat veya daha sonra yapılan yağmur PUNCH® 40 EC'nin etkinliğini azaltmaz.

KULLANILMASI:

KÜLTÜR BİTKİSİ	HASTALIK	KULLANMA DOZU	SON ULAŞILMA İLE HASTA APASINDAKİ SÖRE
Bağ	Kilime (Uromyces necator)	3 ml/100 L su	28 gün
Elma	Karaleke (Venturia anaemalis) Kilime (Podosphaera leucotricha)	5 ml/100 L su 6 ml/100 L su	28 gün
Sekepancan	Yaprak leke Hastalığı (Cercospora beticola) Kilime (Erysiphe polygona)	20 ml/dekar 15 ml/dekar	28 gün

FİTOKSİTE:
PUNCH® 40 EC tavsiyeye uygun kullanımında fitotoksik değildir.

PUNCH® 40 EC

ZEHİRLİ

Fungistik (Nanlar ilacı)
EMULSİYON KONSANTRE
Ülrede 400 gr FLUSILAZOL
(Bis(4-fluorophenyl)methyl-1H-1,2,4-yltriazol-yl-methyl)silane
LD₅₀: Sıçanlarda akut ağızdan 674 mg/kg.

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EYDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GİDALAR DAN UZAK TUTUNUZ.
- İLAÇI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DUVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEMİNİZ, SİĞARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- İLAÇLANMIŞ SAHAYA BİR GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Gözze kaşınması halinde zarar verebilir. Yutulduğunda, temas ettiğinde veya deri yoluyla alındığında zararlıdır. Göz, burnu, boğaz ve deriyi rahatsız edebilir. Deri ile teması halinde bol su ile yıkayınız. Göz ile teması halinde ise bol su ile yıkayıp doktora başvurunuz.

Antidotlar Yoktur.
Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) telefon numaralarını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114



10 Ağustos 2008

TARIM VE KÖŞİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DAYANIKLILIK:
Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle, direnç ortaya çıkması ve gelişmesinin önlenmesi açısından ilaçlama programına, PUNCH® 40 EC veya diğer Steril İnhibitörlerden farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerle dahi edilmesi tavsiye edilir. Aynı yerde bir sezonda bağda ve almada 5' ten fazla, sekepancanında ise 2' den fazla, PUNCH® 40 EC uygulaması yapılmaz.
Bu program içinde, PUNCH® 40 EC'nin hastalığın yoğun olduğu dönemlerde kullanılması midederinin başkanı için önerilidir.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Normal (sekin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz. İlaç kapalı ambalajında, gübre, tohum, gıda maddeleri ve yemlerden uzakta depolanır. Yemciler - Ambalajı kapalı olarak kırılmamış ve ateşten uzak, havalandırılan serin bir yerde muhafaza edilir.

Balık ve yabani hayvanlara zararlıdır. Su kaynakları, çayır/mera ve tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulasmayı önler.
İlaçlama aletlerinin temizlenmesi veya atılması için edilmemesi sırasında ilacın su kaynaklarına bulasmasını, Boğ ambalajı, kullanılmayan ilacı su kaynaklarından uzak ermiş bir yere gömünüz veya yetkililer tarafından tavsiye edilen diğer yollarda yok ediniz.
Açık alana dökmemek yasaktır.

ALICININ DİKKATİNE İLAKKA BEYANI :
Dupont bu ilacın etiketindeki kimyevi maddelere uygunluğunu ve normal kullanım şartlarında, tavsiyeye göre kullanıldığında, etkide yer alan maddelere geyirine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahalü zarar, maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamaların meydana gelebilir ki bunlar Dupont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyeye uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Dupont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilebilir. DUPONT BU İLAÇIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMAMASINDAN MENDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhşat Sahibi:
Dupont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Dileova Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Tuna Caddesi No:1
Dileova/Kocaeli
Tel: 0262-754 56 60
Faks: 0262-754 98 54

Distribütör:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gıda Organize Sanayi Bölgesi
İhsanidede Cad. 700. Sok.
41480 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262-751 14 12 / 7 hat
Faks: 0262-751 14 22

Üretici:
Dupont de Nemours & Co. (Inc.)
Wilmington, Delaware 19898 USA

Dupont Türkiye Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.



