

DuPont™ Lexone® 70 WG

Herbicida selectivo para control de malas hierbas en alfalfa, patata, tomate, trigo, cebada y espárrago .

Ingrediente activo	metribuzina 70 %
Familia química	triazinonas
Formulación	Granulado dispersable en agua - WG
Envase	5 x 100 g / 500 g
Clasificación Toxicológica	Nocivo, Xn Peligroso para el Medio Ambiente, N



Número de Registro : 24035

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de vww.mapya.es (acceso directo desde nuestra sección de enlaces).

Características :

- Lexone® 70 WG es un herbicida de pre y postemergencia, con amplio espectro de acción, que controla malas hierbas anuales de hoja estrecha y de hoja ancha.
- Lexone® 70 WG es selectivo en los cultivos de patata, tomate, trigo y cebada de ciclo largo ,espárrago y alfalfa en parada invernal.
- Lexone® 70 WG posee absorción foliar y radicular.
- Lexone® 70 WG controla entre otras las siguientes malas hierbas : *Amaranthus, Diplotaxis, Fumaria, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Papaver, Poa, Portulaca, Raphanus, Setaria, Sinapis, Sonchus, Taraxacum, Urtica, Veronica.*

Observaciones :

- Aplicar en pulverización a baja presión y con un gasto de 400 - 600 litros de caldo/ha.
- No utilizar en terrenos muy arenosos. Evitar que la niebla de pulverización alcance cultivos vecinos.
- Una correcta humedad del suelo es necesaria en las aplicaciones de preemergencia. En postemergencia, las malas hierbas son sensibles desde cotiledones hasta 2-4 hojas verdaderas.
- Lexone® DF puede mezclarse con Granstar® en tratamientos herbicidas de cereal y con Titus® en tratamientos herbicidas en tomate.

Aplicaciones autorizadas y Dosis :

Cultivo	Malas Hierbas	Dosis kg/ha	Momento de Aplicación
Patata	Gramíneas y dicotiledóneas anuales	0,75	<p>En preemergencia, no aplicar en variedades tipo muy tempranas.</p> <p>Puede aplicarse en las siguientes variedades: Arran-Banner, Desirée, Etoile de León, Kidney , King, Edward, Red Pontiac, Kennebec, , Royal, Palova, Claudia,.</p> <p>Para otras variedades consultar a nuestro servicio técnico.</p>
Tomate	Dicotiledóneas anuales		<p>Preplantación (antes de la plantación).</p> <p>Post emergencia: tanto en tomate de siembra directa como en tomate de transplante, una vez superada la crisis del mismo.</p>
Espárrago	Gramíneas y Dicotiledóneas anuales	0,75	<p>Aplicar en preemergencia del cultivo una vez preparados los caballones y antes de la emergencia de los turiones.</p>
Trigo y cebada (ciclo largo)	Dicotiledóneas anuales	0,1	<p>Aplicar en preemergencia del cultivo o bien en post emergencia a partir de la tercera hoja del cereal.</p> <p>En Post emergencia se recomienda mezclar con Granstar®.</p>