

DuPont™ Pyrgos™

Insecticida para el control de cochinillas, orugas y otros insectos

Ingrediente activo	clorpirifos 48%
Familia química	organofosforados
Formulación	concentrado emulsionable
Envase	1 litro; 5 litros
Clasificación Toxicológica	Nocivo, Xn Peligroso para el medio ambiente, N



Número de Registro : 21804

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de www.mapya.es (acceso directo desde nuestra sección de enlaces).

Plazo de Seguridad :

7 días para alcañofa y solanáceas (tomate, pimiento, berenjena) y 21 días para el resto de los cultivos.

Características :

- Pyrgos™ es un insecticida polivalente, altamente eficaz contra múltiples cochinillas, orugas y con buen control sobre otras plagas como coleópteros, trips e insectos de suelo.
- Pyrgos™ es un insecticida muy efectivo gracias a su triple modo de acción :
 - Acción por contacto directo sobre el insecto.
 - Acción por ingestión.
 - Acción por inhalación, y por lo tanto un elevado efecto de choque.
- Pyrgos™ es especialmente activo contra algunas cochinillas de los cítricos, como el piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*), y el cotonet (*Plannococcus citri*). Para el control del piojo rojo de California se aconsejan comenzar los tratamientos al inicio de verano.

Observaciones :

- No tratar en época o áreas con actividad de abejas.

- Alternar o mezclar con otros insecticidas de distinto modo de acción para evitar la aparición y/o proliferación de poblaciones de insectos tolerantes.
- Riesgo de fitotoxicidad en algunas variedades de vid, especialmente en tratamientos tempranos. No aplicar sobre remolacha en estado precoz, ni sobre remolacha de mesa, chirivía, nabo, colinabo y maíz dulce.
- En algunos cultivos, especialmente maíz, hay riesgo de fitotoxicidad en mezclas con algunos herbicidas (sulfonilureas), o en aplicaciones próximas en tiempo al tratamiento herbicida.
- Lea detenidamente la etiqueta de Pyrgos™ y use sólo el producto conforme a las indicaciones que en ella se reflejan.

Aplicaciones autorizadas y Dosis :

Cultivo	Plagas	Dosis	Condiciones de Aplicación
Hortícolas : Solanáceas, alcachofa, cebolla, col china, rábano, repollo y zanahoria	Orugas	0,15% - 0,20% (de 150 a 200 ml. / 100 litros de agua)	Aplicar al aparecer la plaga, repitiendo cuando sea necesario. Pulverizar bien todas las partes de la planta, tanto en el haz como en el envés de las hojas, principalmente cuando se trata de mosca blanca.
Cítricos	Cochinillas, prays, mosca blanca y pulgón		
Platanera	Cochinillas, lapillas, mosca blanca, orugas y picudo		
Vid	Piral y polillas, Castañeta, gorgojo, gusano gris, melazo y mosquito verde		
Fresales, frambueso y grosellero	Rosquilla negra y otras orugas		
Patata	Escarabajo y polilla		
Cereales	Zabro, antes del encañado		
Maíz	Rosquilla negra, Heliothis y taladro		
Alfalfa, algodónero y remolacha azucarera	Orugas		
Eriales	Ortopteros		