

DU PONT®
Titus®



Titus®

Sólo de DuPont

Herbicida

**Granulado dispersable
 en agua (WG)**

Composición:

Rimsulfuron 25% p/p (250 gr./kg.)

LEASE DETENIDAMENTE ESTA
 ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL
 PRODUCTO.

USO RESERVADO A AGRICULTORES
 Y APLICADORES PROFESIONALES

Inscrito en el Registro Oficial de
 Productos Fitosanitarios con el N°
 19186/13 por

DU PONT IBERICA, S.L
 Av. Diagonal, 561 - 08029
 BARCELONA
 Tel. 93 227 60 00

Fabricado por Du Pont de Nemours
 (France) S.A.S, París (Francia).

® Marca registrada de
 E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

CARACTERISTICAS

Titus® es un nuevo herbicida de la familia de las sulfonilureas que actúa tanto por vía foliar como radicular y que presenta una rápida degradación en el suelo.

Es necesaria la adición del SURFACTANTE DP al 0,25% a fin de mejorar la absorción del producto por las hojas de las malas hierbas.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos herbicidas contra malas hierbas, gramíneas y dicotiledóneas, en postemergencia de las mismas, en los cultivos de:

Maiz en postemergencia.

Tomate (de siembra directa) a partir de 2-3 hojas verdaderas, (de trasplante) cuando haya superado la crisis del mismo.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACION

MAIZ

Contra malas hierbas de hoja ancha y gramíneas anuales aplicar de 30-50 gramos de Titus® por Hectárea. Contra Echinochloa, Lolium y Panicum hasta el estado de comienzo de ahijado. Contra Setaria, Digitaria sanguinalis, Abutilón y Xanthium strumarium, hasta el estado de 2/3 hojas y contra otras dicotiledóneas (Amaranthus, Artemisa verlotiorum, Calistegia, Capsella, Coronopus, Diplotaxis, Eruca versicaria, Helianthus annuus, Portulaca, Reseda, Sinapis, Sonchus oleraceus y Stellaria hasta 4-6 hojas de las adventicias.

Contra Sorghum halepense utilizar de 50-60 gramos de Titus® por Hectárea, aplicándolo cuando la mayoría de las malas hierbas estén ya nacidas y siempre que el Sorghum no tenga más de 20 cm.

En caso de nuevas germinaciones de malas hierbas después del tratamiento de Titus®, puede ser conveniente hacer una segunda aplicación 2-3 semanas después de la primera a la dosis de 20-30 gramos por Hectárea.

Tratar en todos los casos en postemergencia del maíz hasta el estado de 8 collares visibles, es decir 8 hojas totalmente desarrolladas.

Se recomienda no regar hasta después de transcurridas 72 horas de la aplicación del Titus®, al objeto de obtener la mejor eficacia y selectividad.

En algunos casos puede ser conveniente la aplicación de otro herbicida complementario contra hierbas de hoja ancha.

TOMATE

Tratar a la dosis de 30-60 g/Ha. cuando el tomate de siembra tenga de 2-3 hojas verdaderas o en tomates de trasplante cuando haya superado la crisis del trasplante. Titus® controla la mayoría de las adventicias del tomate

tanto gramíneas como de hoja ancha. Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza en el estado de cotiledones a 2 hojas de las malas hierbas, con un buen nivel de humedad en el suelo.

Puede ser conveniente la adición de LEXONE DF (metribuzina) en presencia de Chenopodium, Polygonum y Portulaca.

En el caso de emergencias escalonadas de las adventicias, se podrá realizar un segundo e incluso un tercer tratamiento de Titus®, separados entre sí de una a dos semanas. No sobrepasar la dosis de 110 g/Ha. en el total del ciclo del cultivo

CONDICIONES DE APLICACION


PREPARACION DEL CALDO: Titus® se diluye fácilmente en el agua. Echar agua en el depósito hasta 1/4 de su capacidad. Añadir Titus® con el agitador en marcha y añadir entonces SURFACTANTE DP. Acabar de llenar el depósito con el resto de agua, continuando la agitación. Utilizar el caldo el mismo día de su preparación.


VOLUMEN DE CALDO: Pulverizar uniformemente a baja presión, usando un equipo bien calibrado, con agitación continua. Usar la suficiente cantidad de agua para asegurar un reparto uniforme; de esta forma, con los equipos de aplicación terrestre utilizar 200-300 l/Ha. y se recomienda no sobrepasar los 400 l/Ha.

No tratar en días de viento, con el fin de evitar que la pulverización alcance los cultivos vecinos. Evitar en lo posible tratar el cultivo cuando sufra cualquier estrés (falta o exceso de agua, temperaturas extremas, dificultades de nascencia, etc.).

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACION

Antes de aplicar, asegúrese de tener el equipo limpio. Para evitar daños en los cultivos pulverizados posteriormente, limpiar a fondo todo el equipo de aplicación inmediatamente después de aplicar el producto, siguiendo estos pasos:





1. Vaciar el equipo. Enjuagar a fondo el depósito del equipo de aplicación, la barra y las mangueras con agua limpia. Quitar cualquier poso visible.
2. Llenar el depósito con agua limpia y un litro de amoníaco casero (conteniendo el 3% de amoníaco) por cada 100 litros de agua. Enjuagar las mangueras, barra y boquillas con la solución limpiadora. Añadir más agua hasta llenar completamente el depósito. Hacer circular la solución limpiadora a través del depósito y las mangueras durante al menos 15 minutos. Enjuagar de nuevo las mangueras, barra y boquillas con la solución y después vaciar el depósito.
3. Quitar las boquillas y filtros y limpiar separadamente en un cubo que contenga la solución limpiadora.
4. Repetir el paso 2.
5. Aclarar el depósito, la barra y las mangueras con agua limpia varias veces.

Llevar ropas protectoras durante la limpieza y no limpiar el equipo de aplicación en un recinto cerrado.

OBSERVACIÓN

Para evitar la aparición y proliferación de biotipos naturales resistentes al Titus® de algunas de las hierbas citadas en esta etiqueta, se recomienda usar el producto con otro herbicida cuyo modo de acción sea diferente, pero con buena eficacia herbicida, bien en secuencia, rotación o mezcla.

CULTIVOS SIGUIENTES

De acuerdo con los datos disponibles, puede sembrarse o trasplantarse después de los cultivos del maíz o tomate, siempre que se respeten los normales intervalos entre cultivos y se utilicen las dosis de Titus® indicadas en esta etiqueta, los de patata, maíz o tomate.

INCOMPATIBILIDADES

ATENCIÓN: No aplicar Titus® en los cultivos de maíz o tomate donde se haya utilizado en la siembra o trasplante un insecticida organofosforado sistémico (Terbufos, Forato, Fonofos e Isofenfos y Disulfoton), ya que puede afectar a la selectividad del cultivo. No utilizar ningún insecticida organofosforado en el intervalo de 7 días antes o 4 días después de la aplicación del herbicida.

VARIEDADES

Titus® es selectivo en la mayoría de variedades de tomate y maíz (forrajeras y de grano), en buen desarrollo vegetativo. A veces pueden aparecer ligeras amarilleces después de la aplicación, sin que ello represente ninguna consecuencia para el cultivo.

No se deberá utilizar en variedades de maíz dulce o en campos de producción de semilla de maíz.

GARANTIA

Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos ensayos, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Xi



Irritante

IRRITA LOS OJOS

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO. (Si es posible muéstrela la etiqueta.)

ANTIDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO EN CASO DE INTOXICACION O ACCIDENTE:

Síntomas de intoxicación:

- Irritación de ojos.
- Náuseas, vómitos y diarreas.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón.
- Si se ha ingerido y la persona está consciente provoque el vómito.
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Recomendaciones al médico:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.

Teléfono 91 562.04.20

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales :

Mamíferos:	A
Aves:	A
Peces:	A

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

