

Inhoud: **10 Kg e**

# Nematicide Insecticide



# Vydate® 10G

van DuPont

Nematicide, insecticide voor de bestrijding van aaltjes en/of insecten in bieten, aardappelen, lelies, wortelen en spruitkool.

Granulaat  
Werkzame stof: oxamyl  
Gehalte: 10%  
Toxicologische groep: carbamoyl-oxim met cholinesterase-remmende werking.

**TOELATINGSNUMMER: 12409 N (W.3)**

**GEBRUIKSAANWIJZING:** zie Etiket.

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.**

**STORL**  
**VERPAKKING**

Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente.

Geproduceerd in Frankrijk

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.  
Baanhoekweg 22 - 3313 LA Dordrecht  
Tel.: 078-6301101

® Gedeponoerd handelsmerk van  
E.I. du Pont de Nemours and Company



K-12040/30512 (FRONT) - THE NETHERLANDS



### Vergiftig



### Milieugevaarlijk

#### BIJZONDERE GEVAREN

- Vergiftig bij opname door de mond.
- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

#### EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

**Bij vermoeden van vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen. Het antidotum is atropine sulfaat.**

**Na INADEMING:** Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en in de frisse lucht brengen. Geef zuurstof of kunstmatige ademhaling, indien nodig. Raadpleeg een arts na aanzienlijke blootstelling.

**Na morsen op KLEREN en HUID:** De verontreinigde kleding verwijderen; haar en huid onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding wassen voordat het opnieuw wordt gebruikt. Na spatten in de **OGEN:** de oogleden goed opensperren en gedurende 15 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

**Na INSLIKKEN:** het slachtoffer zal meestal bij bewustzijn blijven. Geef onmiddellijk 1-2 glazen water te drinken en wek braken op. Bewustloze mensen niets via de mond toedienen en niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

#### OVERIGE VERMELDINGEN

- In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum in Dordrecht, telefoonnummer **078-630 1899**.
- Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken: [www.nld.ag.dupont.com](http://www.nld.ag.dupont.com). Ook kunt u bellen: **078-630 1101**.

#### OPSLAG

Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als grondbehandelingsmiddel:

- in de teelt van bieten, mits toegepast als rijenbehandeling in een arbeidsgang met het zaaien;
- in de teelt van aardappelen, mits toegepast kort voor of tijdens het poten op zodanige wijze dat het middel in een arbeidsgang wordt gestrooid en ingewerkt;
- in de teelt van lelies, met dien verstande dat het middel in één arbeidsgang wordt toegepast en ingewerkt.
- in de teelt van wortelen, mits toegepast als rijenbehandeling in één arbeidsgang met het zaaien of mits toegepast kort voor of tijdens het zaaien op zodanig wijze dat het middel in één arbeidsgang wordt gestrooid en ingewerkt.
- in de teelt van spruitkool, met dien verstande dat het middel in één arbeidsgang wordt toegepast en ingewerkt.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### ALGEMEEN

##### Werkling

**VDYDATE® 10 G** is een systemisch werkend middel in granulaatvorm dat insecten- en aaltjesdodende eigenschappen bezit. Het wordt in de grond gebracht en van daaruit door de plantwortels opgenomen en in de plant verspreid.

#### PLAGEN

##### Werkingspectrum

o.a. de volgende soorten worden bestreden:

Aaltjes:	Insecten:
Bietencystenaaltjes ( <i>Heterodera sp.</i> )	Bietekevertje
Vrijlevende aaltjes ( <i>Trichodorus sp.</i> )	Springstaarten
Wortelknobbelaaltjes ( <i>Meloidogyne sp.</i> )	
Aardappelsystenaaltjes ( <i>Globodera sp.</i> )	
Wortellesieaaltjes ( <i>Pratylenchus sp.</i> )	

#### TOEPASSINGEN

##### Algemeen

**VDYDATE® 10 G** moet homogeen worden verdeeld. Het vereist goed afgestelde strooiapparatuur om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

#### BIETEN

##### Gebruik

**VDYDATE® 10 G** kan ingezet worden tegen bietekevertjes, springstaarten of aaltjes.

Ter voorkoming van schade door het bietekevertje, springstaarten of aaltjes het middel tijdens het zaaien in de zaai voor aanbrengen door middel van een aan de zaaimachine gekoppelde deugdelijke granulaatstrooier of opbouwset.

Met name schade veroorzaakt door aaltjes in de beginontwikkeling van het gewas wordt voorkomen.

##### Dosering:

- bietencystenaaltjes: 25 kg per ha
- wortelknobbelaaltjes: 15 kg per ha
- vrijlevende aaltjes: 10 kg per ha
- bietekevertje en springstaarten: 7,5 kg per ha

#### AARDAPPELEN

##### Gebruik

**VDYDATE® 10 G** kan ingezet worden tegen aaltjes.

Dit kan in de vorm van een volveldsbehandeling, een toplaagbehandeling of een rijenbehandeling tijdens het poten.

##### VOLVELDSBEHANDELING

Ter voorkoming van schade door aaltjes dient het middel vlak voor of tijdens het pootklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid.

Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 à 15 cm. Het meest geschikt voor het inwerken is een frees, maar ook andere werktuigen waarmee een gelijkmatige menging wordt bereikt zijn bruikbaar.

Dosering: 40 kg per ha.

##### TOPLAAGBEHANDELING

Op percelen waar na de najaarsontsmetting met vloeibare middelen de grond niet kerend is bewerkt kan voorafgaande aan een eventuele grondbewerking in het voorjaar **VDYDATE® 10 G** volvelds worden gestrooid en ingewerkt in de toplaag (5 cm) van de grond. De toplaag wordt bij de najaarsontsmetting namelijk het slechtst ontsmet en verkrijgt zo een extra behandeling. Deze toepassing dient zo kort mogelijk voor het poten te geschieden.

Dosering: 20 kg per ha.

##### RIJENBEHANDELING TIJDENS HET POTEN:

Bij tegen *Globodera pallida* (het witte aardappelsystenaaltje) partiel resistente rassen kan het middel tijdens het poten, met behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur worden uitgestrooid in de aardappelrug op een strook met een breedte van 25-30 cm.

Hierdoor wordt de beginontwikkeling van het gewas bevorderd, waardoor later tijdens het groeiseizoen de resistente eigenschappen beter tot hun recht komen. Schade, zowel opbrengst- als kwaliteitsverlies, door aaltjes van met name wortellesie- en wortelknobbelaaltjes, wordt grotendeels voorkomen door deze behandeling. Eveneens wordt opbrengstverlies door vrijlevende aaltjes grotendeels voorkomen.

Dosering: 10 kg per ha.

#### LELIES

##### Gebruik

**VDYDATE® 10 G** kan voor of na het planten ingezet worden tegen wortellesieaaltjes.

##### Voor planten:

Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 à 15 cm.

##### Na het planten:

Direct na het planten (in ieder geval voor opkomst van het gewas) een éénmalige rijenbehandeling boven de geplante bollen uitvoeren met daarvoor in aanmerking komende apparatuur waarmee het middel in de grond wordt gebracht en direct wordt toegedekt.

Dosering: 40 kg per ha.

#### WORTELEN

##### Gebruik

**VDYDATE® 10 G** kan als rijenbehandeling tijdens het zaaien of als volveldstoepassing kort voor of tijdens het zaaien worden ingezet tegen vrijlevende aaltjes, wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes.

##### RIJENBEHANDELING:

Het middel tijdens het zaaien in de zaai voor aanbrengen door middel van een aan de zaaimachine gekoppelde daartoe geëigende granulaatstrooier of apparaat.

Dosering: 10 kg per ha, gebaseerd op een rugafstand van minimaal 50 cm breed.

##### VOLVELDSBEHANDELING:

Het middel dient vlak voor of tijdens het plantklaar maken van de grond volvelds te worden gestrooid. Het middel zo gelijkmatig mogelijk over het oppervlak verdelen met daarvoor geschikte strooiapparatuur en direct inwerken tot een diepte van 10 à 15 cm.

Dosering: 40 kg per ha.

#### SPRUITKOOL

##### Gebruik

**VDYDATE® 10 G** kan ingezet worden tegen bietencystenaaltjes.

Ter beperking van schade door bietencystenaaltjes het middel kort voor het uitplanten strooien en direct inwerken met een frees of een ander werktuig waarmee een gelijkmatige menging wordt bereikt.

Dosering: 40 kg per ha.

#### BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid. Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Chargennummer:  
zie op de verpakking