



## Steward® - Efterlängad ny insekticid nu registrerad!

Den 20 april 2011 blev Steward® godkänt för användning i följande grödor på fält:

- Raps och rybs
- Äpple och päron
- Broccoli, rödkål, vitkål, blomkål, savoykål och brysselkål

och följande kulturer i växthus:

- Gurka, tomat, paprika, zucchini, pumpa, chili, aubergine och melon



### Steward® 30 WG

- är en helt ny aktiv substans för bekämpning av insekter i respektive kultur.
- är en resistensbrytare till andra insekticider.
- ska användas i första behandlingen mot rapsbaggar (får inte köras i blom).
- har bättre långtidseffekt än övriga produkter när det gäller rapsbagge-bekämpningen, vilket kan leda till färre antal behandlingar.
- ett viktigt komplement för fruktodlarna vid bekämpning av äpplevecklare.
- är en användarvänlig produkt i granulatformulering för att minska hanteringsrisken vid påfyllnad av sprututrustningen.

Följande gäller för Steward® enligt Kemikalieinspektionens beslut 20 april 2011

**Produkt och innehåll:** Steward® 30 WG - Indoxacarb 30 vikt-%

**Registreringsnummer:** 4979

**Godkännandet gäller t.o.m 2014-12-31**

#### Användningsområde:

Mot insekter i odlingar av raps och rybs. Behandling i raps och rybs får ej ske senare än i utvecklingsstadiet (BBCH) 57, sidokotten: individuella blomknoppar synliga men fortfarande slutna.



Mot skadeinsekter i odlingar av äpple och päron. Behandling av äpple och päron får ej ske senare än 7 dagar före skörd.

Mot skadeinsekter i odlingar av broccoli, blomkål, vitkål, rödkål och savoykål. Behandling i broccoli, blomkål, och huvudkål får ej ske senare än 1 dag före skörd.

Mot skadeinsekter i odlingar av brysselkål. Behandling i brysselkål får ej ske senare än 28 dagar före skörd.

Mot skade insekter i växthusodlingar av gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin och melon. Behandling i gurka, zucchini, pumpa, tomat, paprika, chili, aubergin och melon får ej ske senare än 1 dag före skörd.



**Behörighetsklass:** 2 L

**Övrigt:** I bruksanvisningen till medlet ska följande framgå:

Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda.

Får inte användas där bin aktivt söker föda. Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under 3 dagar efter behandling.



Vid behandling i växthus ska utplacerade kolonier av humlor eller andra pollinerande insekter stängas till eller tas bort ur odlingen innan sprutning och får åter introduceras tidigast 3 dagar efter behandlingen.

**Observera: Övertäckning av bikupa i 3 dagar får endast göras efter avgörande från biodlaren att övertäckningen kan ske utan risk för skada på bisamhället.**

För ytterligare information kontakta DuPont enligt nedan.

Vänliga hälsningar  
DuPont Sverige  
[www.dupont.se/agro](http://www.dupont.se/agro)



Jan-Åke Svensson  
mobil: 0708-680 470  
kontor: 040-44 54 24



Henrik "Henke" Claeson  
mobil: 0808-680 474



Sara Helgstrand  
mobil; 0702-000 731