



Registreringsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och lin. Endast för vårbehandling.

Aktiv substans

Metsulfuronmetyl, 50 viktprocent.

Behörighetsklass 2 L.

Formulering

Ally 50 ST är formulerat som Brustablett.

Förpackning

Ally 50 ST är förpackat i rör om 10 st. tabletter.

Varje tablett väger 7,5 g.

Lagring Torrt i obruten förpackning.



Effekt

Ogrässpektra

Arvraps	●●●	Plister	●●●
Baldersbrå	●●●	Snärjmåra	●
Blåklint	●●	Svinmålla	●●
Dån	●●●	Trampört	●
Förgätmigej	●●	Vallmo	●●●
Gullkrage	●●●	Veronika	●
Harkål	●●	Våtarv	●●●
Jordrök	●	Åkerbinda	●●
Kamomill	●●●	Åkerpilört	●●●
Lomme	●●●	Åkerspergel	●●●
Näva	●●	Åkertistel	●●(●)
Penningört	●●	Åkerviol	●●●

- Mycket god effekt
- God effekt
- Begränsad effekt
- () 1 lin utan vätmedel

Rekommendation

Gröda	Dosering	Ogräsproblem
Höstvete, råg, rågvete, höstkorn	0,8-1 tablett Ally 50 ST + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten	Baldersbrå, viol m fl
Korn, vårvete	0,8-tablett Ally 50 ST + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten	Gullkrage, viol m fl
Havre	0,8 tablett Ally 50 ST + 0,5 dl vätmedel/100 l vatten	Gullkrage, viol m fl
Vårsäd	0,8 tablett Ally 50 ST + 0,25 dl vätmedel/100 l vatten + 1,0 l MCPA	Gullkrage, viol, svinmålla
Oljelin, spånadslin	0,8 tablett Ally 50 ST + 0,2 l MCPA OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas.	Örtogräs
Oljelin, spånadslin	0,8 tablett Ally 50 ST + 0,2 l MCPA + 15 g Gratil OBS! Vätmedel ska INTE tillsättas.	Örtogräs, snärjmåra

Allmän information

Ally 50 ST med den verksamma beståndsdelen metsulfuronmetyl är en systemisk herbicid formulerad som en Brustablett.

Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1–3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas undertrycks kraftigt av Ally 50 ST. Verknings sättet, både bladverkande och jordverkande, ökar säkerheten att uppnå god ogräseffekt och minskar väderberoendet vid behandlingstidpunkten.

Om sprutning med Ally 50 ST sker när marken är torr uppnås full jordverkan enbart om det faller så mycket regn att rotzonen genomfuktas inom den första veckan.

På mulljordar som är helt torra vid spruttillfället måste genomfuktning ske inom 3–5 dagar. I annat fall verkar produkten enbart genom upptagning via bladen.

Växtföljd

Maxdosen för Ally 50 ST är 1,07 tab/ha och år.

Stråsäd och höstoljeväxter kan odlas som efterföljande gröda samma år utan begränsningar.

Efterföljande år kan följande grödor odlas: stråsäd med eller utan insädd, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärter, bönor och lin.

Behandling i havresorten Matilda avråds.